INSERTO
ALCOHOL ANTISEPTICO LIDEX®
SOLUCIÓN TÓPICA Etanol 70° G.L.
USO EXTERNO

COMPOSICIÓN:
Cada 100mL de solución contiene:

Alcohol Etílico 96 %	72,91 ml.
Agua purificada	c.s.p. 100,00 ml.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO:
Forma farmacéutica: Solución Tópica
Descripción: Solución incolora, transparente, de olor característico, libre de partículas extrañas.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

- Frascos de polietileno de alta densidad (HDPE) color blanco opaco con Tapa rosca de polietileno de alta densidad (HDPE) color blanco; Liner de polipropileno color blanco: 60 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3785 ml de Solución + prospecto QR.
- Frascos de polietileno de alta densidad (HDPE) blanco transparente con Tapa rosca de polietileno de alta densidad (HDPE) color blanco; Liner de polipropileno color blanco: 60 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3785 ml de Solución + prospecto QR.
- Frascos de polietileno de alta densidad (HDPE) color blanco opaco con Tapa rosca de polietileno de alta densidad (HDPE) color rojo; Liner de polipropileno color blanco: 60 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3785 ml de Solución + prospecto QR.
- Frascos de polietileno de alta densidad (HDPE) blanco transparente con Tapa rosca de polietileno de alta densidad (HDPE) color rojo; Liner de polipropileno color blanco: 60 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3785 ml de Solución + prospecto QR.
- Frascos de polietileno de alta densidad con atomizador pistola de 60 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml de solución tópica + prospecto QR.
- Frascos de polietileno de alta densidad con atomizador casquillo de 60 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml de solución tópica + prospecto QR.
- Frascos de polietileno de alta densidad con atomizador spray de 60 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml de solución tópica + prospecto QR.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

GRUPO FARMACOTERAPÉUTICO:
Grupo farmacoterapéutico: Antisépticos y desinfectantes, otros antisépticos desinfectantes, etanol, código ATC: D08AX08

INDICACIONES:
Antiséptico de la piel.
ALCOHOL ANTISEPTICO LIDEX® es un antiséptico tópico que elimina gran cantidad de bacterias, cuando es aplicado sobre la piel. Se utiliza para limpieza y como antiséptico en heridas pequeñas y raspones, no debe utilizarse en cortaduras grandes, ya que lastima los tejidos y favorece la aparición de coágulos que alojan microorganismos vivos en su interior, es por ello que no debe aplicarse en heridas abiertas.
ALCOHOL ANTISEPTICO LIDEX® presenta acción bactericida rápida frente a bacterias gramnegativas y grampositivas, micobacterias, hongos y virus con cubierta lipídica (incluidos VIH y virus de la hepatitis B); sin embargo, no son activos frente a esporas. El etanol 70% presenta la mayor actividad bactericida, ya que destruye alrededor del 90% de las bacterias cutáneas, siempre que el alcohol permanezca en contacto con la piel al menos 2 minutos sin secarse tras la aplicación.
Medicamento de venta libre.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
Posología
Para lavado de heridas se emplea sin diluir, vertiendo directamente sobre la herida o empapando una gasa o algodón y aplicando suavemente en la región de la piel que se desea aplicar y luego se deja actuar por dos minutos. Se puede aplicar el antiséptico las veces que sea necesario en herida o rasguño. No existe riesgo de sobredosificación.

Forma de administración
Uso cutáneo. Solo para uso externo. No ingerir.
Se recomienda lavar las manos antes de cada aplicación. Su actividad germicida aumenta cuando previamente se limpia la piel con agua y detergente, y se frota con suavidad. Dado que los ensayos para establecer actividad bactericida y viricida utilizan tiempos mínimos de 30 s, se debe prestar atención tanto al volumen de formulación administrado como al tiempo de frotado. Como recomendación general, si las manos se secan luego de una fricción o frotado de 10-15 s, es probable que el volumen de formulación aplicado haya sido insuficiente, en cuyo caso se sugiere repetir la aplicación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Tópica, cutánea, uso externo.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
No aplicar en la piel erosionada o en heridas abiertas o en caso de que los pacientes hayan sufrido quemaduras graves. Puede causar irritación.

PRECAUCIONES DE USO:
Solo para uso externo /tópico. No ingerir. Evite el contacto con los ojos y de ocurrir contacto por accidente, se recomienda enjuagar con abundante agua y consultar con el oftalmólogo, si fuese necesario. No aplicar sobre las mucosas, heridas o quemaduras: la aplicación de alcohol reseca, es dolorosa, irritante y demora el proceso de cicatrización.
No se debe utilizar cuando la piel está sucia, hay que lavar el área antes de aplicar el alcohol. Para que surta mayor efecto tiene que secarse por completo.
Fácilmente inflamable. Mantener el recipiente bien cerrado. Proteger del calor.
No fumar durante su aplicación.
No poner en contacto con las mucosas.
El uso prolongado puede producir irritación y sequedad en la piel.
Puede producir dermatitis de contacto.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:
No se han realizado estudios de interacciones.

SOBRE DOSIFICACIÓN:
No procede

ADVERTENCIAS:
Si los síntomas persisten consulte a su médico.
Producto de uso delicado.
Producto fácilmente inflamable. Mantener en envases bien cerrados y evitar la exposición al sol, calor y fuentes de ignición. No fumar durante su aplicación. No poner en contacto con las mucosas, es muy irritante. Evite contacto con los ojos y de ocurrir contacto por accidente se recomienda enjaguar con abundante agua.
No se debe utilizar cuando la piel está sucia, hay que lavar el área antes de aplicar el alcohol. Para que surta mayor efecto tiene que secarse por completo.
El uso prolongado puede producir irritación y sequedad en la piel.
Puede producir dermatitis de contacto.

ADVERTENCIA Y USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA:
Si está embaraza o en periodo de lactancia, cree que pudiera estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS:
La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

EFECTOS ADVERSOS:
El uso prolongado puede producir irritación y sequedad en la piel.
Puede producir dermatitis de contacto.

ALMACENAMIENTO:
Mantener a temperatura no mayor a 30°C, en frascos bien cerrados.
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

MEDICAMENTO DE VENTA LIBRE.

FABRICANTE:
Elaborado por: TEXTIQUIM CÍA.LTDA. QUITO – ECUADOR
Dirección: Vicente Duque No 77-443 y Juan de Selis
Telfs: (593)2 2478062
(593)2 2478063
(593)2 2478068
www.textiquim.com
E-mail: prosania@textiquim.com

TextiQuim